

Suspektní případ COVID-19

A Osoba splňující klinická A epidemiologická kritéria:

Klinická kritéria:

- Akutní nástup horečky A kašle;

NEBO

- Akutní nástup **KTERÝCHKOLIV TŘÍ NEBO VÍCE** z následujících známek nebo příznaků: Horečka, kašel, celková slabost/únava, bolest hlavy, myalgie, bolest v krku, koryza, dušnost, anorexie/nevolnost/zvracení, průjem, změna duševního stavu.

A

Epidemiologická kritéria:

- Pobývání nebo práce v **oblasti s vysokým rizikem přenosu viru**: uzavřené rezidenční prostředí a humanitární prostředí, jako například tábory a podobná prostředí pro vysídlené osoby; kdykoliv v průběhu 14 dnů před nástupem příznaků;

NEBO

- Pobývání **v oblasti s komunitním přenosem** nebo cestování do této oblasti kdykoliv v průběhu 14 dnů před nástupem příznaků;

NEBO

- Práce ve **zdravotnictví**, a to jak ve zdravotnických zařízeních, tak v rámci terénní péče, kdykoliv v průběhu 14 dnů před nástupem příznaků.

B Pacient se **závažným akutním respiračním onemocněním** (SARI: akutní respirační infekce s dříve naměřenou horečkou ≥ 38 °C; a kašlem; s nástupem onemocnění v průběhu posledních 10 dnů; vyžadující hospitalizaci).

Pravděpodobný případ COVID-19

A Pacient splňující výše uvedená **klinická kritéria A** je **kontaktem pravděpodobného nebo potvrzeného případu**, nebo je epidemiologicky spojen s klastrem případů, v němž byl identifikován alespoň jeden potvrzený případ.

B **Suspektní případ, u něhož zobrazovací metody vyšetření hrudníku** vykazují známky onemocnění COVID-19*

C Osoba, u níž se nedávno objevila **anosmie** (ztráta čichu) nebo **ageuzie** (ztráta chuti) bez jiné zjištěné příčiny.

D **Úmrtí** bez jiného vysvětlení u dospělého s **dechovou tísní** před smrtí A který **byl kontaktem pravděpodobného nebo potvrzeného případu** nebo je epidemiologicky spojen s klastrem případů, v němž byl identifikován alespoň jeden potvrzený případ.

*Mezi typické nálezy zobrazovacích metod hrudníku poukazující na COVID-19 patří následující:

- rentgen hrudníku: nejasná opacita, často se zaoblenou morfologií, na okraji plic a v jejich spodní části
- CT hrudníku: několik oboustranných opacit charakteru mléčného skla, často se zaoblenou morfologií, na okraji plic a v jejich spodní části
- ultrazvuk plic: zesílené pleurální linie, B linie (víceohniskové, samostatné nebo splývající), konsolidační vzorce se vzdušnými bronchogramy nebo bez nich.

Potvrzený případ COVID-19

Osoba s **laboratorně potvrzenou nákazou COVID-19** bez ohledu na klinické známky a příznaky.

Podrobnosti viz [Pokyny pro laboratorní testování na přítomnost onemocnění koronavirem \(COVID-19\) u suspektních lidských případů](#).

Poznámka: Pro stanovení potřeby dalšího posouzení u pacientů, kteří výslovně nespĺňují klinická nebo epidemiologická kritéria, je třeba situaci posoudit z klinického pohledu a pohledu veřejného zdraví. **Definice případů pro sledování by neměly být užívány pro účely klinického řízení.**